

OMIX® / EDEGAL®


Conține: 607 g/l propamocarb
Formulare: Concentrat solubil (SL)

Fungicid sistemic pentru combaterea manei și căderii plănuțelor la tomate și plante ornamentale

Beneficiile oferite de OMIX®

- Oferă culturilor un nivel ridicat de Protecție și de Siguranță, indiferent de stadiul de creștere al acestora
- O bună absorbție prin rădăcini și transportare acropetală
- Poate fi folosit la culturi cultivate în toate tipurile de condiții protejate - sticlă sau plastic precum și în pepiniere
- Stimulează rezistența plantelor, înrădăcinarea și înflorirea
- Protejează semințele în timpul germinării, plantele tinere și butașii, împotriva putrezirii plantei și a rădăcinii

Mod de acțiune: OMIX® este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă - blochează dezvoltarea miceliului, având o bună distribuție în plantă (ascendentă și descendentă). Produsul este absorbit prin rădăcini și frunze, într-un timp destul de scurt de la aplicarea tratamentului. Propamocarbul inhibă biosinteza fosfolipidelor și a acizilor grași și prin urmare inhibarea germinării sporilor, creșterea și pătrunderea miceliului în plante precum și blocarea dezvoltării miceliului ciupercii în planta gazda.



OMIX® / EDEGAL®

Recomandări de utilizare

Culturi	Agent patogen	Utilizare Doza (l/ha)	Timp de pauză
Plante ornamentale (seră)	MANA (<i>Phytophthora spp.</i>) PUTREGAIUL / CĂDEREA PLANTUȚELOR (<i>Pythium spp.</i>)	Dezinfecție: 300 mL/m ³ /substrat Se aplică prin incorporare în sol, înainte de însămânțare; Volum de apă: 10 - 20 L/m ³ /sol/substrat Sau Udare: 10 mL/m ² Se aplică prin irigare, la însămânțare, după tăieri, transplantare, sădire în ghiveci Volum de apă: 3 - 5 L/m ² Nr. de tratamente: 1 pentru aplicarea prin încorporarea în sol înainte de însămânțare și 2 în cazul aplicării prin irigare, la însămânțare; Interval minim între tratamente: Primul tratament (aplicare prin irigare) se face înainte de însămânțare, după tăieri, transplantare, sădire în ghiveci, iar cel de- al doilea după 14 - 21 zile de la primul tratament.	Timpul de pauză este acoperit de perioada dintre ultima aplicare și recoltare.
Tomate (seră)	MANA (<i>Phytophthora spp.</i>) PUTREGAIUL / CĂDEREA PLANTUȚELOR (<i>Pythium spp.</i>)	Dezinfecție: 300 mL/m ³ /substrat Aplicare prin încorporare în sol, înainte de însămânțare; Volum de apă 10 - 20 L / m ³ /substrat Sau Udare: 5 - 6 mL / m ² Se aplică prin irigare, la însămânțare; Volum de apă 3 – 5 L / m ² Nr. maxim de tratamente: 1 pentru aplicarea prin încorporarea în sol înainte de însămânțare și 3 în cazul aplicării prin irigare, la însămânțare; Interval între tratamente: 14 - 21 zile Interval minim între tratamente: Primul tratament (aplicare prin irigare) se face la însămânțare, iar următoarele două tratamente se fac la un interval de 7 - 10 zile.	3 zile