

- ☀ ការលាយផ្សំថ្នាំកសិកម្មដោយរូបមន្តថ្មីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកំចាត់ជំងឺផ្សិតដែលលក្ខណៈជ្រាបចូលបានលឿននិងឆាប់រលាយក្នុងសរីរាង្គកាយដំណាំដោយសារធាតុរាវរបស់ថ្នាំជាអាហាររបស់ដំណាំដែលមានសកម្មភាពក្នុងការការពារនិងកំចាត់ជំងឺផ្សិតប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងថ្នាំមានលក្ខណៈជ្រាបចូល ។
- ☀ ដំណើរការចំបងនៃសកម្មភាពចំពោះរបស់ថ្នាំអាចកំចាត់ជំងឺផ្សិត គឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់របស់ដំណាំទៅនឹងជំងឺផ្សិតបានល្អ និងការពារដំណាំមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់។
- ☀ បង្កើតលក្ខណៈបែតងបានយូរគឺជាសកម្មភាពបង្កឡើងដោយថ្នាំដែលរួមបញ្ចូលជាមួយភ្នាក់ងារការពារនិងប្រឆាំងការស្រូបសរសៃរបស់ដំណាំដើម្បីសំរួលឡើងវិញអោយដំណាំឡើងពណ៌បែតងបានឆាប់រហ័ស និងជួយកាត់បន្ថយនូវការពុលរបស់ថ្នាំកសិកម្មផ្សេងៗទៀត ។
- ☀ ថ្នាំម៉ាក Cadilac បានចុះបញ្ជីការពិភពលោកអនុញ្ញាតិអោយប្រើលើ70ប្រភេទដំណាំនិងជម្ងឺ400ប្រភេទដែលបង្កឡើងដោយក្រុមផ្សិតដូចជា៖ (Phycomycetes, Ascomycetes,Deuteromycetes, Basidiomycetes)



ប្រភេទដំណាំ	ប្រភេទជំងឺលើដំណាំ និងកំរិតនៃការប្រើប្រាស់
ស្រូវ	លើស្លឹក និង ប្លាស់ បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
ស្វាយ ស្វាយចន្ទី ម្សៅ ធុរ្គី ឆ្កែបន់ កៅស៊ូ ម្រេច	ជាខ្មៅលើផ្លែ ស្លឹក និងផ្កា អុចលើស្លឹក ងាប់មែក លើស្លឹក ឆ្កែបន់ ឆ្កែបន់ បរិមាណថ្នាំចំនួន 75g-100g/25លីត្រទឹក
បន្លែស្លឹក	រលាកស្រទប់ស្លឹក អុចកងលើស្លឹក ឆេះស្លឹក និងផ្សិតសំឡី បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
កាហ្វេ	ពណ៌ច្រេះលើស្លឹកនិងផ្លែ បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក
បន្លែផ្លែ ដំឡូងប្រាំង រោត ដំឡូងមី សណ្តែក	រលាកស្រទប់ស្លឹក អុចកងលើស្លឹក ឆេះស្លឹក ផ្សិតសំឡី ជាខ្មៅលើផ្លែ ស្លឹក និងឆ្កែបន់ បរិមាណថ្នាំចំនួន 50g-75g/25លីត្រទឹក