

ធាតុសកម្ម : - Thiamethoxam141g/l
 : - Lambda Cyhalothrin106g/l

បែកឈាម ២៤៧SC គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ដង្កូវរួមផ្សំមានឥទ្ធិពលដោយប្រាបចូល ដោយផ្ទាល់ តាមផ្លូវដង្ហើម មានវិសាលភាពធំ ប្រសិទ្ធិភាពសត្វជញ្ជក់បានយ៉ាងលឿន ហើយខ្លាំង ។



វិធីប្រើប្រាស់ :

ដំណាំ	កត្តាបំផ្លាញ	បរិមាណប្រើប្រាស់
ស្រូវ	ទ្រីប ចែម្បាស មមាច នឹងសត្វ ស្រឹង នឹងសត្វជញ្ជក់គ្រប់ប្រភេទ	១៥-២០ ម.ល/១៦ លីត្រទឹក (ប្រើប្រាស់ ២០០-២៥០ ម.ល/៣០០លីត្រទឹក/ហិ.ត)
បន្លែ-សណ្តែក	ទ្រីប ចែម្បាស គោមី រុយស ស្រឹង ស្រមើ នឹងសត្វជញ្ជក់គ្រប់ប្រភេទ	១៥-២០ ម.ល/១៦ លីត្រទឹក (ប្រើប្រាស់ ២០០-២៥០ ម.ល/៣០០លីត្រទឹក/ហិ.ត)
ដំណាំហូបផ្លែ ដំណាំឧស្សាហកម្ម	ទ្រីប ពឹងពាងក្រហម មូសតែ ស្រឹង ស្រមើ នឹងសត្វជញ្ជក់គ្រប់ប្រភេទ	១៥-២០ ម.ល/១៦ លីត្រទឹក (ប្រើប្រាស់ ២០០-២៥០ ម.ល/៣០០លីត្រទឹក/ហិ.ត)



ឯកទេសកម្ចាត់ : មមាច ទ្រីប ទាវក្ក រុយស គោមី ស្រមើ ចែស ពឹងពាងក្រហម សត្វស្លាបរិច និងដង្កូវបំផ្លាញដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

