

Z ថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅស្រូវ អាណុភាត វីបាក់ ៤០SC

Anupheap Ribac 40SC

Bispyribac-Sodium.....40%

ឯកទេសកម្ចាត់ស្មៅស្រូវ (ស្មៅផ្កាធំ) នៅក្នុងស្រែ !

មុខសញ្ញានៃការប្រើ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំស្រូវ

ឈ្មោះទូទៅ (Common name): Bispyribac-sodium
ឈ្មោះក្រុមគីមី (Chemical group): Phenoxy-carboxylic acid
ធាតុសកម្ម (A.I): Sodium 2,6-bis (4,6-dimethoxypyrimidin-2-yloxy) benzoate 40%SC

វីបាក់ 40SC គឺជាថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅជំរើស, ក្រោយដំណុះគ្រាប់ មានប្រតិកម្មដោយជ្រាបចូល, សុវត្ថិភាពដល់ដំណាំស្រូវ ។ ថ្នាំកំចាត់បាន ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទស្មៅនៅក្នុងស្រែ ដូចជា : ស្មៅស្រូវ ស្មៅបែកក្បាល ស្មៅទឹកប្រៃ, ស្មៅស្លឹកធំ ជន្ទល់ភ្នំ កក់គ្រប់ប្រភេទ និង ស្មៅមួយចំនួនផ្សេងទៀត ។

វិធីនៃការប្រើ

បាញ់ថ្នាំក្រោយពេល ស្រូវស្ទឹង រីព្រោះ បានរយះពេលពី ៨ ទៅ ១៥ថ្ងៃ ប្រើថ្នាំ

វីបាក់ ចំណុះ ១០មល លាយជាមួយប្រេងបង្កើនប្រសិទ្ធិភាព ចំណុះ ១០មល លាយទឹកក្នុងធុងបាញ់ថ្នាំ ២៥លីត្រទឹក។



ចំណាំ :

ត្រូវត្រឡប់មកមើលវិញបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់

- ត្រូវបញ្ចេញទឹកជាមុនសិន មុននឹងបាញ់ថ្នាំ (បើអាចធ្វើបាន)
- ត្រូវបញ្ចូលទឹកក្នុងស្រែបន្ទាប់ពីបាញ់ថ្នាំបានរយះពេលពី ១-៣ថ្ងៃ ។
- មិនត្រូវទុកអោយដីស្រែស្ងួតហួតហែងមុន នឹងក្រោយបាញ់ថ្នាំទេ (បើអាចធ្វើបាន)