



សារធាតុផ្សំ :

(N): 0.17 % (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>): 0 % (K<sub>2</sub>O): 0 %

របៀបប្រើប្រាស់ :



| ដំណាំ                                                               | ពេលវេលាប្រើប្រាស់                  | រយៈពេលមុនប្រមូលផល    | កម្រិតប្រើប្រាស់           |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| ស្រូវ                                                               | បាញ់ដី<br>ស្រូវបែកគុម្ព            | ឈប់បាញ់ដី<br>១៥ ថ្ងៃ | ៥០ ម.ល /<br>ឆ្នុង ១៦ លីត្រ |
| ដំណាំ ពោត<br>សណ្តែក បន្លែគ្រប់ប្រភេទ                                | បាញ់ដីដំណាំ<br>២-៣ ស្លឹក           | ឈប់បាញ់ដី<br>១៥ ថ្ងៃ | ៥០ ម.ល /<br>ឆ្នុង ១៦ លីត្រ |
| ដំណាំឧស្សាហកម្ម: កាហ្វេ<br>ដូង កៅស៊ូ ស្វាយ ស្វាយចន្ទីរ<br>ម្រេច.... | ក្រោយប្រមូលផល<br>ដើមដុះត្រួយ មែក   | ឈប់បាញ់ដី<br>១៥ ថ្ងៃ | ៥០ ម.ល /<br>ឆ្នុង ១៦ លីត្រ |
| ដំណាំយកមើម: ដំឡូងជ្វា<br>ដំឡូងមី ត្រាវ ឆៃថាវ បិក្ខុក...             | បាញ់ដីពេលកកើតមើម<br>និង ចិញ្ចឹមមើម | ឈប់បាញ់ដី<br>១៥ ថ្ងៃ | ៥០ ម.ល /<br>ឆ្នុង ១៦ លីត្រ |

ប្រសិទ្ធិភាពសំរាប់ដំណាំគ្រប់ប្រភេទ

បូសប្រើប្រាស់ ផ្កាស្រូវ ផ្លែដំឡូង មើមដំឡូង ការការពារប្រេងផ្លែ និងប្រេងដើម

សារធាតុផ្សំផ្សេងៗទៀត : Calcium: 400 g/l Zinc: 10g/l  
Boron (B): 0,050%v/w Iron (Fe)0,150%v/w Manganese: 40g/l



ចំណុះស្រូវ  
១០០ក្រ



អត្ថប្រយោជន៍: Zen-Force Ca+Zn

- ប្រើប្រាស់នៅដំណាក់កាលចេញក្តីប នឹងមើម ជួយអោយគ្រាប់ធំធ្លោស នឹងមើមធំល្អ។
- ដំណាំមិនមាននៅបញ្ហា ប្រេងផ្លែ ប្រេងដើម ដោយសារតែមានសារធាតុ Calcium នឹង Boron បន្ថែមជាពិសេសដើម្បីការពារ។
- ដំណាំមានសភាពដើមរឹងមាំ នឹងសុខភាព ល្អ ដោយមានសារធាតុសង្កសីខ្លាំង។

