

PERDORIMI

Vrshitari, kontrollon: *Plasmopara viticola*, *Phomopsis viticola* ne dozen 150-250 gr/100 l uje
Domate, Specë, Patllixhan, kontrollon: *Phytophthora infestans*, *Septoria lycopersici*, *Alternaria spp.*, *Colletotrichum phomoides*, *Cladosporium fulvum* ne dozen 200gr/100 l uje
Trangull, kontrollon: *Pseudoperonospora cubensis*, *Colletotrichum lagenarium*, *Cladosporium cucumerinum*, Ne dozen 200gr/100 l uje
Qepe, Hudhra, Presh, kontrollon: *Alternaria spp.*, *Puccinia allii*, *Peronospora destructor*, *Botrytis spp.* ne dozen 200-250 gr/100 l uje
Patate, kontrollon: *Phytophthora infestans*, ne dozen 200-250 gr/100 l uje
Frutore Farore (Mollë, Dardhe), kontrollon: *Venturia inaequalis*, *Venturia pirina*, *Septoria spp.* ne dozen 200-250 gr/100 l uje
Berhamore (Kajsiqersh, Pjeshke, kumbull), kontrollon: *Sigmina carpophylla* ne dozen 200-250 gr/100 l uje
Agrume, kontrollon: *Colletotrichum gloeosporioides*, *Phytophthora spp.*, *Capnodium citri*, *Septoria spp.* ne dozen 200-250 gr/100 l uje
Aplikohen zakonisht 2-4 trajtime ne interval 7-10 dite.

Verejtje per perdorimin:

Ne fillim perzibet preparati me pak uje dhe kur te jete homogenizuar mire shtohet sasia tjeter e ujit. Normat e perdorimit te ujit levizin 200-2000 liter sipas kulturave dhe stadeve vegetative. Nuk perzibet me vajra minerale dhe produkte alkaline.

Fitotoksiciteti:

Nuk eshte fitotoksik kur perdoret ne kulturat e mesiperme dhe sipas dozave te rekomanduara.

Koha e prishmerise (karenca):

Rush 28 dite; domate, specë, patllixhan, trangull, pjepër 14 dite ne fushë dhe 7 dite ne sera; laker 21 dite; sallate 14 dite; patate 7 dite; qepe 28 dite; agrume 14 dite; fruta farore e berhamore 28 dite.

Ndikimi ne ekosistem:

Pak helmuës per bletet. Helmuës per peshqit. Helmuës per jovertebroret ujore. Mos ndoti ujrut me preparatin ose me ambalazhin e tij.

Magazinimi:

Ruajeni në ambalazhin original, në vende të thata e të ajrosura, të shpangura nga rezet direkte të diellit dhe në temperaturë nen 38° C.

60 mm

Prodhuës:



www.agria.bg

Importues dhe Distributor:
NTP JONATAN-P Prizren-Kosovo

AGRIA MANCOZEB 80 WP

Permban: Mancozeb 80%
Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

Fungicid kontakti me veprim parambrojtes ne luftimin e semundjeve te ndryshme kerpudhore si: vrugjet, kromat, antraknozot, septoriozat, alternariozat, ndryshqet, fusariozat, pitumet e te tjera. Ne saje te pembajtes ne formule te joneve magnez dhe zink ka veprim te dukshem ne stimulimin e mases vegjetative dhe proceseve te fotosintezes.



500gr

Shënim: KUJDES

Shënimet e rrezikut:

H361d – Dyshohet që dëmtion foshnjët e palindura
H317 – Mund të shkaktojë reagim alergjik të lëkurës

H400 – Shumë toksik për jetën ujore

Shënimet parambrojtëse:

Preventimi:

P280 – Mbatni doreza mbrojtëse

P273 – Evitoni derdhjet në mjedis

Reagimi

P302 + P352 – NË RAST KONTAKTI ME

LËKURË: Shpërlani me ujë dhe sapun të bollshëm

P308 + P313 – NË RAST EKSPOZIMI: Kërkoni

ndihmë/këshillë mjekësore

P391 – Grumbulloni rrjedhjet

Eliminimi:

P501 – Përbajten dhe ambalazhin eliminoni

sipas legjisllacionit vendor/ndërkombëtar

EU 401 – Për të evituar rrezikun ndaj shëndetit

human dhe publik, përbajuni udhëzimeve të

perdorimit



Permbajtja: Mancozeb 80%

Formulimi: Pluhur i lagshem (WP)

Masat parambrojtëse:

- Mbrojeni në vende të sigurt dhe larg femijëve, ushqimeve të njerezve dhe kafsheve, ujit të pijshëm.
- Gjate punes mos hani dhe mos pini lengje e duhan.
- Gjate punes vialmi rrobet e punes, paisjet mbrojtëse per syte dhe fytyren (doreza, syzet, mbrojtësen e fytyres, etj.).
- Mbas punes dhe perpara ngrenies lani duart dhe pjeset e ekspozuara te lekures me uje te bollshem dhe sapun.
- Mbas mbarimit te punes lani paisjet mbrojtëse, mjetet e sperkatjes.
- Asgjësoni ambalazhet sipas ligjeve ne fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe keshilla

per mjekun:

- Ne rast kontakti me lekuren, lajeni me uje te bollshem dhe me sapun.
- Ne rast kontakti me syte, lani menjehere me uje te bollshem dhe konsultojuni me mjekun.
- Ne rast gellitjeje, kerkoni menjehere ndihme mjekësore ne qendren spitalore me te afert.
- Ne rast dentimi, largojeni pacientin nga zona e rrezikut. Nese i dentuari ka humbur ndjenjat, shtrijeni dhe transportojeni ne pozicion anesor. Haqini menjehere rrobet e ndotura. I tregoni mjekut etiketen e preparatit.
- Nuk ka antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Nr dhe data e regjistrimit :

35-3375-2012; 03/04/2019

Sasia neto: 500gr

Periudha e ruajtjes: 3 Vjet

Data e prodhimit: