

Masat parambrojtëse:

- Mbrojtjen në vende të sigurta dhe të pa arriueshme nga fëmijët.
- Ruajtjen në vende të thata dhe të freskëta, larg ujqimeve, pijeve dhe ushqimeve për blegtorinë.
- Evitoni kontaktet zgjatura të syve dhe lekures me preparatit.
- Evitoni marrjen e preparatit me organet e frymëmarrjes gjatë përgatitjes së solucionit spërkatës dhe gjatë spërkatjes.
- Gjatë përdorimit mos ha e mos pi ujë dhe duhan.
- Gjatë punës përdor pajisje mbrojtëse: këmishë, dorëza, maska, syze.
- Në përfundim të punës lairi duart dhe pjesët e ekspozuara të trupit, si dhe pajisjet mbrojtëse dhe njetet spërkatëse.
- Aftësimi i ambalazheve të bëhet sipas rregullave në fuqi.

Udhëzime për ndihmën e parë dhe keshilla për mjekimin:

- Në rast kontakti me lekuren ose mukozat, lahari me ujë të bollshëm dhe sapun.
- Në rast thëllje të tretësirës spërkatëse me organet e frymëmarrjes, i akcidentuari duhet të marrë menjëherë mjekim dhe të shpëtojë menjëherë.
- Në rast helmimi, kërkon menjëherë ndihmë në qendrën më të afërt spitalore duke i treguar mjekut etiketën e këtij produkti. Nuk njihet antidoti specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Përdorimi:

Është fungicid sistemi dhe kontakti me veprim të dyfishtë, duke frenuar zhvillimin e micelit të kerpudhës (Cymoxanili) dhe frumës për mbajtjen e sporeve të kerpudhës (Mancozeb). Përdoret në trajtimet preventive dhe në ato kurative. Për trajtimin Cymoxanili deperton në indet bimëzore brenda 6 orëve dhe, në sajë të lehtëzimit citotropikë e transaminarë merret nga miceli i kerpudhës duke penguar zhvillimin e micelit, ndërsa Mancozebi ka veprim të zgjatur dhe të lartë biologjik si dhe në sajë të përmbajtjes së Manganezi dhe Zingut ka veprim të lartë stimulues mbi masën vegetative.



Prodhuar:

zenithcropsciences.com

CUPROSATE GOLD M 72 WP

Lenda vepruese: Cymoxanil 8% + Mancozeb 64%

Formulimi: Pëlhur i lagshëm (WP)

Fungicid specifik, me veprim të fuqishëm e të shpejtë
sistemi dhe kontakti për luftimin e vrugjeve

Shënim: 3. Xi
1. Dëmshëm për ujë



Nëse dëmshëm për
mushkujt



500 gr

Frazat e mezikut: H137, H361, H410

Frazat e sigurisë: P280, P273, P302 + P352, P308 + P313, P391, P501, EUH 401

Në spërkatje: Kërshë (*Physiphora caprea*), me 1.5-2 kg/ha, duke kryer deri 3 trajtime pas mbijeljes së bimës në fushë.
Në dëgjim: për luftimin e (*Physiphora* spp dhe *Peronospora viticola*) me 200-250 gr/100 litra ujë.
Në lëndë shërbuese: Për luftimin e vrugjeve të ndryshme shkakuar nga kerpudhat e gjatë përcaktuesat, me 150-200 gr/100 litra ujë.

Vendje për përdorimin:

- Përshes me produkte të tjera me përshes të atyre me rrezikshmëri të lartë.
- Nuk duhet të përdoret në kulturat që kanë kaluar nëse nga temperaturat e ulëta, ujë e shpirt, theksim e të tjera.

Ndihmë në shërbime:

- Nuk duhet të përdoret ndaj bimëve.
- Nuk duhet të përdoret ndaj produkteve përbërëse me ndihmë ajër me këto produkte ose emulsiat e tj.

Karanca:

10-14 ditë për të gjithë kulturat e rekomanduara.

Magazini:

Duket në vende të sigurt, pa lagështi, dhe në temperaturë 5 deri 35 gradë Celsius.

Në ditë datë e regjistrimit: 26/03/2012 / 24.12.2012

Sasia neto: 250 gr

Përshes e ruajtjes: 2 Vjetë

Data e prodhimit:

Në i lloji:

Importues dhe Distributor :
NTP JONATAN-P Prizren-Kosovo