Product name: market/ country	0.250 kg Triomax
Dimensions:	190 x 370 mm
Date:	01.2019
Print colours:	Process CMYK ☐ Pantone
Printing house	Полипласт

190 mm

148 mm

•Masat parambrojtese:
• Mbajeni ne vende te sigurta dhe te pa arriteshme nga femijet.
•Ruajeni ne vende te thata dhe te fresketa, larg ushqimeve dhe pijeve per njerezit dhe ushqimeve per blegtorine.
•Evitoni kontaktete zgjatura te syve dhe lekures me preparatin.
•Evitoni marjn e preparatit me organet e frymemarrjes gjate pregatitjes se solucionit sperkates dhe gjate sperkatjes.
•Gjate perdorimit mos ha e mos pi uje dhe duhan.
•Gjate punes perdor paisje mbrojtese: kominoshe, doreza, maska, syze.
•Ne perfundim te punes lani duart dhe pjeset e ekspozuara te trupit si dhe paisjet mbrojtese dhe mjetet sperkatese.
•Asgjesimi i ambalazheve te behet sipas rregullave ne fuqi.

Udhezime per ndihmen e pare dhe keshilla per mjekun:
•Ne rast kontakti me lekuren ose mukozat, lahuni me uje te bolleshem dhe sapun.
•Ne rast thithje te tretesires sperkatese me organet e frymemarrjes, i aksidentuari çohet ne nje mjedis te ngrohte dhe te ajrosur.
•Ne rast helmimi, kerkoni menjehere ndihme ne qendren me te afert spitalore, duke i treguar mjekut etiketen e ketij produkti.
•Nuk njihet antidot specifik. Mjekimi sipas simptomave.

Perdorimi:
Eshte fungicid sistemi dhe kontakti, me veprim te dyfishte, duke frenuar zhvillimin e micelit te kerpudhes (cymoxanili) dhe frenues per mbirjen e sporeve te kerpudhave (mancozebi dhe folpeti). Perdoret ne trajtimet preventive dhe ne ato kurative. Pas trajtimit, cymoxanili deperton ne indet bimore brenda 6 oreve dhe, ne saje, te levizjes citotropike e translaminare merret nga miceli i kerpudhes duke penguar zhvillimin e micelit, ndersa mankozebi dhe oxycloruri Cu kane veprim te zgjatur dhe te larte biologjik si dhe, ne saje te permbajtjes se manganit dhe zingut ne mancozeb, ka veprim te larte stimulues mbi masen vegjetative.

Ne hardhi: Kunder vrugut (Plasmophora viticola). Trajtimet fillojne kur çfaqet rreziku i infeksionit nga vrugu, pra kur lastarte kane arritur gjatesine 10 cm dhe kur kemi reshje dhe lageshit te mjaftueshme ne gjethe. Trajtimet ne fazat e para jane gjithashtu te efekteshme edhe kunder nekrozes. Doza e perdorimit eshte 250-300 gr/100 lit uje. Ne vartesi te infeksionit trajtimet mund te perseriten çdo 7-10 dite.

TRIOMAX 45 WP

Lënda vepruese:
4 % Cymoxanil, 12 % Mancozeb, 29 % Oxsidklorur bakri
Formulimi : Pluhur i lagshem (WP)

TRIOMAX 45 Wp eshte fungicid i kombinuar me veprim kontakti (parandalues) dhe mbrojtes. Eshte sistemik lokal dhe sherues. Perdoret per konmtrollin e vrugjeve ne domate, patate, kungullore, vresht, etj.

Klasa 3, Xi
I DEMSHEM, IRRITUES

N - I DEMSHEM PËR MJEDISIN

250 gr

Frazat e rrezikut: H332, H302, H317, H319, H361,H410
Frrazat e sigurise: P261, P280, P273, P264, P304 + P340, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P301 + P312, P308 + P313, P391, P501

EUH 401

Prodhues:
ZENITH CROP SCIENCES BULGARIA LTD
zenithcropsciences.com

Importues dhe Distributor :
NTP JONATAN-P Prizren-Kosovo

Ne perime: Kunder vrugut te domates dhe te specit (Phytophtora spp), me 250-300 gr/100 lit uje.
Ne patate: Kunder vrugut (Phytophthora infestans), me 250-300 gr/100 lit uje.
Ne bimet zbukuruese: Per luftimin e vrugjeve te ndryshme, me 250-300 gr/100 lit uje.
Mund te aplikohen deri 4 trajtime/sezon, me interval 7-14 dite. Perdoret para shfaqjes se infeksioneve ose menjehere pas shfaqjes se tyre. Veprimi sherues ndodh nese trajtimi kryhet 24-48 ore pas infeksionit dhe zgjat 6-7 dite. Veprimi parandalues zgjat 14 dite. Perdoret 400-800 lit solucion/ha.

Verejtje per perdorimin:
• Perzihet me produktet e tjera me perjashtim te atyre me reaksion alkalin.
• Nuk duhet te perdoret ne kultura qe kane kaluar strese nga temperaturat e uleta, uitja e tepert, thatesire, e te tjera.

Ndikimi ne ekosistem:
Nuk eshte helmues ndaj bleteve.
Eshte helmues ndaj peshqeve, prandaj mos ndotni ujrat me kete produkt ose ambalazhet e tij.

Karenca:
7 dite per sojen, pataten dhe domaten; 5 dite per kungulloret; 10-14 dite per vreshtin; 15 dite per perimet e tjera.

Magazinimi:
Ruhet ne vende te sigurta, pa lageshti dhe ne temperature 5 deri 35 grade celsius

Nr dhe data e regjistrimit: 32-3372-2012 / 24.12.2012

Sasia neto: **250 gr**

Afati i ruajtjes: **3 vjet**

Nr i lotit:

Data e prodhimit: