

PETUNJUK PERTOLONGAN PERTAMA PADA KERACUNAN

- Tanggalkan pakaian yang terkena fungisida ini dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun.
- Apabila fungisida ini mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama kurang lebih 15 menit.
- Apabila fungisida ini tertelan dan penderita masih sadar, segera usahakan pemutihan dengan memberikan minum segelas air hangat yang diberi 1 sendok garam dapur.
- Apabila fungisida ini terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar dan bila perlu berikan pernafasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen.

PERAWATAN OLEH DOKTER

- Tidak ada antidote yang spesifik.
- Perawatan diberikan sesuai dengan gejala yang timbul.

PETUNJUK PENGGUNAAN

Fungisida ini dapat disemprotkan secara tunggal atau dicampur dengan pestisida lainnya. Pencampuran dengan fungisida lain yang bersifat kontak sangat disarankan.

Tanaman	Sasaran	Konsentrasi	Cara Aplikasi
Bawang merah	Bercak ungu (<i>Alternaria porri</i>)	1,0 gml/l	Penyemprotan volume tinggi : 400-800 l/ha, menggunakan nosel berbentuk kipas. Penyemprotan dilakukan ketika ditemukan gejala penyakit, dapat diulangi dengan interval per minggu atau sesuai rekomendasi setempat.

No. Batch :
 Bulan/Tahun Produksi :
 Bulan/Tahun Kadaluarsa :



CORIDA® 50 SC

FUNGISIDA

Fungisida bersifat sistemik, berbentuk pekat berwarna putih yang dapat disuspensi dalam air, untuk mengendalikan penyakit bercak ungu (*Alternaria porri*) pada bawang merah.



Bahan aktif : Heksakonasol 50 g/l
 Nomor pendaftaran : RI. 01020120113970

Isi bersih:
500 ml

BACALAH LABEL SEBELUM MENGGUNAKAN PESTISIDA INI



PERINGATAN BAHAYA

Dapat menyebabkan keracunan melalui mulut, kulit dan pernafasan.

PETUNJUK KEAMANAN

SIMPAN DI TEMPAT KERING DAN JAUH DARI JANGKAUAN ANAK-ANAK

- Jangan makan, minum atau merokok pada waktu menggunakan fungisida ini.
- Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mengencerkan dan menyemprot fungisida ini, pakailah sarung tangan, topeng muka, pakaian berlengan panjang dan bercelana panjang.
- Sebelum makan, minum atau merokok dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena dengan air dan sabun hingga bersih.
- Setelah digunakan, segera bersihkan dengan banyak air semua alat dan pakaiannya pelindung.
- Jangan mengotori kolam, perairan dan saluran air dengan fungisida ini atau wadah bekasnya.
- Rusakkanlah wadah bekas dan kemudian tanamlah sekurang-kurangnya 0,5 m dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air dan pemukiman.

GEJALA DINI KERACUNAN

- Dapat menyebabkan gangguan keseimbangan badan, pusing atau mual.
- Apabila satu atau lebih gejala tersebut timbul, segera berhentilah bekerja, lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter.



Pemegang Pendaftaran/Formulator:
PT. Zenith Cropsciences Indonesia
 Gedung 18 Office Park Lt. 22
 Jl. TB Simatupang No. 18 Jakarta 12520